

**МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по Красной книге Кировской области**

12 февраля 2025 года

Кировская область, г. Киров,
ул. Красноармейская, д. 17, каб. 302

Заседание вел председатель Комиссии:

Абашев Т.Э. – министр охраны окружающей среды Кировской области

Присутствовали члены Комиссии: Анисимов Д.С., Ускова Т.М., Баранова О.Г., Букин В.Ю., Егорова Н.Ю., Егошина Т.Л., Кондакова Л.В., Кондрухова С.В., Костылев А.А., Пестов С.В., Рябов В.М., Рябова Е.В., Скопин А.Е., Сотников В.Н., Тарасова Е.М., Феофилактова Л.В., Целищева Л.Г., Черёмухин М.Н., Широких А.А., Шихова Т.Г.

Приглашенные эксперты: Мельникова А.Г., Истомин С.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Формирование предложений по внесению изменений в Перечни животных, растений и грибов, внесенных в Красную книгу Кировской области.

СЛУШАЛИ:

1. Формирование предложений по внесению изменений в Перечни животных, растений и грибов, внесенных в Красную книгу Кировской области.

Пестова С.В. о предложениях по внесению изменений в перечень беспозвоночных животных, занесенных в Красную книгу Кировской области, сформированных членами рабочей группы по беспозвоночным животным.

Сотникова В.Н. о предложениях по внесению изменений в перечень позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Кировской области, сформированных членами рабочей группы по позвоночным животным.

Тарасову Е.М. о предложениях по внесению изменений в перечень растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области, сформированных членами рабочей группы по растениям и грибам.

К обсуждению в рабочих группах внесения изменений в перечни животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской

области, дополнительно привлечены эксперты – специалисты, располагающие данными о распространении и состоянии на территории Кировской области различных групп организмов. Предлагаемые изменения обоснованы научными данными за последние 10 лет, в том числе опубликованными в научных изданиях.

ВЫСТУПИЛИ: члены Комиссии по Красной книге Кировской области, а также Мельникова А.Г.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать министерству охраны окружающей среды Кировской области в Перечне видов животных, занесенных в Красную книгу Кировской области, **сохранить без изменения категории статуса редкости** виды животных согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Рекомендовать министерству охраны окружающей среды Кировской области в Перечне видов животных, занесенных в Красную книгу Кировской области, **изменить категории статуса редкости** видов животных согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.

3. Рекомендовать министерству охраны окружающей среды Кировской области **исключить** из Перечня видов животных, занесенных в Красную книгу Кировской области, виды животных согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.

4. Рекомендовать министерству охраны окружающей среды Кировской области **внести** в Перечень видов животных, занесенных в Красную книгу Кировской области, виды животных согласно Приложению №4 к настоящему протоколу.

5. Рекомендовать министерству охраны окружающей среды Кировской области в Перечне видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области, **сохранить без изменения категории статуса редкости** виды растений и грибов согласно Приложению №5 к настоящему протоколу.

6. Рекомендовать министерству охраны окружающей среды Кировской области в Перечне видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области, **изменить категории статуса редкости** видов растений и грибов согласно Приложению №6 к настоящему протоколу.

7. Рекомендовать министерству охраны окружающей среды Кировской области **исключить** из Перечня видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области, виды растений и грибов согласно Приложению №7 к настоящему протоколу.

8. Рекомендовать министерству охраны окружающей среды Кировской области **внести** в Перечень видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области, виды растений и грибов согласно Приложению №8 к настоящему протоколу.

9. Дополнить перечень видов, вероятно исчезнувших с территории Кировской области видами растений согласно Приложению №9 к настоящему протоколу.

10. Принять во внимание позицию отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Кировской области Водно-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству по вопросу исключения из Перечня видов животных, занесенных в Красную книгу Кировской области, видов рыб: подуст, берш, европейский хариус, обыкновенный подкаменщик, изложенную в письме от 29.01.2025 № 1К/167.

11. Направить в Пермский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ПермНИРО») запрос о предоставлении имеющихся в распоряжении учреждения данных о численности видов рыб: подуст, берш, европейский хариус, обыкновенный подкаменщик.

12. Вынести на заочное голосование Комиссии по Красной книге Кировской области вопрос об изменении Перечня видов рыб, занесенных в Красную книгу Кировской области, видов рыб.

Председатель Комиссии



Т.Э. Абашев

Секретарь Комиссии



Т.М. Ускова

**Виды животных, рекомендованные к сохранению в Перечне видов
животных, занесенных в Красную книгу Кировской области, без
изменения категории статуса редкости**

№	Вид	Категория
1.	Выхухоль - <i>Desmana moschata</i> (Linnaeus, 1758)	I
2.	Ночница Наттерера - <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	III
3.	Усатая ночница - <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	III
4.	Рыжая вечерница - <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	III
5.	Европейская норка - <i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761)	I
6.	Европейский северный олень - <i>Rangifer tarandus tarandus</i> (Linnaeus, 1758)	I
7.	Садовая соня - <i>Elomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766)	III
8.	Европейская чернозобая гагара - <i>Gavia arctica arctica</i> (Linnaeus, 1758)	I
9.	Черношейная поганка - <i>Podiceps nigricollis</i> C.L. Brehm, 1831	III
10.	Красношейная поганка - <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	V
11.	Белый аист - <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	I
12.	Черный аист - <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	I
13.	Краснозобая казарка - <i>Branta ruficollis</i> (Pallas, 1769)	III
14.	Пискулька - <i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	II
15.	Лебедь-кликун - <i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	IV
16.	Скопа - <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	II
17.	Степной лунь - <i>Circus macrourus</i> (S.G. Gmelin, 1771)	III
18.	Змееяд - <i>Circaetus gallicus</i> (J.F. Gmelin, 1788)	I
19.	Большой подорлик - <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811	II
20.	Беркут - <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	I
21.	Могильник - <i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809	III
22.	Кречет - <i>Falco rusticolus</i> Linnaeus, 1758	I
23.	Сапсан - <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	I

24.	Водяной пастушок - <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	III
25.	Погоныш-крошка - <i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	III
26.	Южная золотистая ржанка - <i>Pluvialis apricaria apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	III
27.	Поручейник - <i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	III
28.	Кольчатая горлица - <i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	I
29.	Филин - <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	II
30.	Сплюшка - <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	IV
31.	Серая неясыть - <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	II
32.	Бородатая неясыть - <i>Strix nebulosa</i> Forster, 1772	III
33.	Обыкновенный зимородок - <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	III
34.	Удод - <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	III
35.	Пестрый дрозд - <i>Zoothera varia</i> (Pallas, 1811)	III
36.	Европейская белая лазоревка, или князек - <i>Parus cyanus cyanus</i> Pallas, 1770	I
37.	Обыкновенная медянка - <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	III
38.	Сибирский углозуб - <i>Salamandrella keyserlingii</i> Dybowski, 1870	III
39.	Сибирская минога - <i>Lethenteron kessleri</i> (Anikin, 1905)	III
40.	Речная (Невская) минога - <i>Lampetra fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758)	III
41.	Русский осетр - <i>Acipenser gueldenstaedtii</i> Brandt, 1833	I
42.	Стерлядь - <i>Acipenser ruthenus</i> (Linnaeus, 1758) (популяция верховьев р. Камы)	III
43.	Эна горная – <i>Ena montana</i> (Draparnaud, 1801)	III
44.	Веретеновидка седая – <i>Bulgarica cana</i> (Held, 1836) = <i>Strigillaria cana</i> (Held, 1836)	III
45.	Веретеновидка гладкая – <i>Cochlodina laminata</i> (Montagu, 1803)	III
46.	Слизень черный – <i>Limax cinereoniger</i> Wolg, 1803	III
47.	Веретеновидка восточная – <i>Clausilia pumila sejuncta</i> Westerlund, 1871	III
48.	Завиток-крошка – <i>Vertigo pusilla</i> Müller, 1774	III
49.	Тарантул южнорусский – <i>Allohogna singoriensis</i> (Laxmann, 1770)	III
50.	Дозорщик-император – <i>Anax imperator</i> Leach, 1815	II
51.	Пилохвост восточный – <i>Poecilimon intermedius</i> (Fieber, 1853)	III
52.	Трещотка бугорчатая – <i>Bryodema tuberculatum</i> (Fabricius, 1775)	III

53.	Цикада горная – <i>Cicadetta montana</i> (Scopoli, 1772)	III
54.	Красотел бронзовый – <i>Calosoma inquisitor</i> (Linnaeus, 1758)	II
55.	Жужелица Менетрие – <i>Carabus menetriesi</i> Hummel, 1827	III
56.	Жужелица фиолетовая – <i>Carabus violaceus aurolimbatus</i> Dejean, 1829	I
57.	Жужелица Хеннинга – <i>Carabus henningi</i> Ficher von Waldheim, 1817	III
58.	Каллистус лунный – <i>Callistus lunatus</i> (Fabricius, 1775)	III
59.	Жук-олень – <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	I
60.	Отшельник обыкновенный – <i>Osmoderma barnabita</i> Motschulsky, 1845	I
61.	Бронзовка сомнительная – <i>Protaetia fieberi</i> (Kraatz, 1880) (<i>Potosia fieberi</i> (Kraatz, 1880))	III
62.	Бронзовка гладкая – <i>Protaetia speciosissima</i> (Scopoli, 1786) (<i>Protaetia aeruginosa</i> (Drury, 1770))	II
63.	Хрущ мраморный – <i>Polyphylla fullo</i> (Linnaeus, 1758)	III
64.	Усач-дубильщик – <i>Tragosoma depsarium</i> (Linnaeus, 1767)	II
65.	Дровосек-кожевник – <i>Prionus coriarius</i> (Linnaeus, 1758)	III
66.	Лептура красногрудая – <i>Leptura thoracica</i> (Creutzer, 1799)	III
67.	Пахита еловая – <i>Pachyta lamed</i> (Linnaeus, 1758)	III
68.	Аллостерна ингрика – <i>Allosterna ingrica</i> (Baechmann, 1902)	II
69.	Усач тонконогий – <i>Rhaphuma gracilipes</i> (Faldermann, 1835)	III
70.	Усач дубовый желтополосый – <i>Plagionotus arcuatus</i> (Linnaeus, 1758)	III
71.	Усач дубовый пестрый – <i>Plagionotus detritus</i> (Linnaeus, 1758)	III
72.	Мегахила шмелевидная – <i>Megachile bombycina</i> Radoszkowski, 1874	III
73.	Аммобатойдес брюшистый – <i>Ammobatoides abdominalis</i> (Eversmann, 1852)	II
74.	Шмель modestus – <i>Bombus modestus</i> Eversmann, 1852	III
75.	Шмель плодовый – <i>Bombus pomorum</i> (Panzer, 1805)	III
76.	Шмель пластинчатозубый – <i>Bombus cullumanus serrisquama</i> Morawitz, 1888 (<i>Bombus serrisquama</i> Morawitz, 1888)	III
77.	Аполлон обыкновенный – <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758) (<i>Parnassius apollo democratus</i> (Krulikowsky, 1906))	II
78.	Мнемозина – <i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	III
79.	Павлиноглазка малая – <i>Eudia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)	III

80.	Прозерпина – <i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	III
81.	Орденская лента малиновая – <i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767)	III
82.	Маллота трехцветная – <i>Mallota tricolor</i> Loew, 1871	III
83.	Шершневидка большая – <i>Spilomia maxima</i> Sack, 1910	II

Вашингтон

**Виды животных, рекомендованные к изменению категории статуса
редкости в Перечне видов животных, занесенных в Красную книгу
Кировской области**

№	Вид	2014	2025	Обоснование
1.	Лебедь-шипун - <i>Cygnus olor</i> (J.F. Gmelin, 1789)	IV	V	Численность увеличивается. В последние годы регистрируются случаи успешного гнездования лебедей - шипунов в регионе.
2.	Орлан-белохвост - <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	I	V	Численность увеличивается
3.	Кобчик - <i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	II	I	Численность уменьшается, места гнездования не известны уже 30 лет
4.	Среднерусская белая куропатка - <i>Lagopus lagopus rossicus</i> Serebrovsky, 1926	III	II	По опросным данным в последние 5-6 лет численность уменьшается даже в оптимальных местообитаниях
5.	Материковый кулик-сорока - <i>Haematopus ostralegus longipes</i> Buturlin, 1910	III	V	Численность вида стабильно высокая, успешно размножается на территории региона
6.	Малая крачка - <i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	III	V	Численность стабильно высокая
7.	Золотистая щурка - <i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	III	V	Расширяет ареал, увеличивает численность
8.	Нельма - <i>Stenodus leucichthys nelma</i> (Pallas, 1773)	III	IV	В последние 10 лет нет сведений о численности
9.	Щелкун ржаво-красный – <i>Elater ferrugineus</i> Linnaeus, 1758	II	IV	Новых данных после 2014 года нет
10.	Пчела-плотник – <i>Xylocopa valga</i> (Gerstaecker, 1872)	III	II	Численность вида на протяжении всего ареала снизилась. Угроза состоянию популяций возросла. Сохранились популяции на самом юге области.
11.	Голубянка Орион – <i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)	II	IV	Новых данных после 2014 года нет. Вид уязвимый в следствие особенностей образа жизни, статус редкости установить пока невозможно.

12.	Маллота мегилиформис – <i>Mallota megilliformis</i> Fallen, 1817	II	III	Новые данные, полученные после 2014 года, не подтверждают снижение численности. Вид со стабильно низкой численностью.
-----	--	----	-----	---

Авант

Виды животных, рекомендованные к исключению из Перечня видов животных, занесенных в Красную книгу Кировской области

№	Вид	2014	2025	Обоснование
1.	Нетопырь Натузиуса - <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling et Blasius, 1839)	V	—	Расширяет ареал, увеличивает численность
2.	Колонок - <i>Mustela sibirica</i> Pallas, 1773	IV	—	Сибирский вид. За 100 лет добыт 3-4 раза (все случаи сомнительные). Отсутствуют подтвержденные встречи представителей вида на протяжении последних 25 лет. Вероятно, на территории области постоянно не живет.
3.	Большая поганка, или чомга - <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	V	—	Расширяет ареал, увеличивает численность
4.	Большая выпь - <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	III	—	Расширяет ареал, увеличивает численность
5.	Болотный лунь - <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	V	—	Расширяет ареал, увеличивает численность
6.	Камышница - <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	V	—	Расширяет ареал, увеличивает численность
7.	Обыкновенный серый сорокопут - <i>Lanius excubitor excubitor</i> Linnaeus, 1758	III	—	Исключен из Красной книги Российской Федерации, встречается по всей территории области
8.	Горихвостка-чернушка - <i>Phoenicurus ochruros</i> (S.G. Gmelin, 1774)	III	—	Появилась в начале XXI века и за 20 лет расселилась по всей территории области с существенным увеличением численности
9.	Краснобрюхая жерлянка - <i>Bombina bombina</i> (Linnaeus, 1761)	IV	—	Находки вида на территории области не подтверждены
10.	Прудовик карельский – <i>Lymnaea carelica</i> Kruglov et Starobogatov, 1983	III	—	Изменение систематического положения таксона, предположительный синоним широко распространенного вида. Систематическая принадлежность моллюсков, внесенных в Красную книгу Кировской области, не определена

11.	Бомбардир черноусый – <i>Brachinus nigricornis</i> Gebler, 1829	III	–	Изредка встречающийся вид в подходящих местообитаний. Недостаток данных о виде обусловлен особенностями образа жизни.
12.	Плавунец родниковый – <i>Oreodytes sanmarkii</i> (Sahlberg, 1826)	III	–	По данным Г.И. Юферева в местах обитания в бассейне р. Ошеть угрозы виду нет. Трудно идентифицируемый вид, а поэтому мало данных для определения причин редкости. Возможно является более распространенным видом.
13.	Бронзовка мраморная – <i>Protaetia marmorata</i> (Herbst, 1786).	III	–	Вид обычен в соответствующих местообитаниях. Угроз численности нет.
14.	Толстяк ивовый – <i>Lamia textor</i> (Linnaeus, 1758)	III	–	Обычный вид с соответствующих местообитаниях. Редко попадает из-за скрытого образа жизни.
15.	Усач краснокрыл средиземноморский – <i>Purpuricenus globulicollis</i> Dejean in Mulsant, 1839	II	–	Имеется единственная находка на самой границе области. Статус и распространение состояние этого вида не ясно. Возможно случайный для фауны области вид.
16.	Усачик изумрудный – <i>Acmaeops smaragdulus</i> (Fabricius, 1792)	III	–	Вид широко распространен, но вид мелкий невзрачный, ведет скрытый образ жизни, поэтому редко попадает. Реальная численность гораздо выше и угроз состоянию вида нет.
17.	Оруссус паразитический – <i>Orussus abietinus</i> (Scopoli, 1763)	III	–	Малочисленный вид, но угроз численности нет. Редко попадает из-за скрытого образа жизни, короткого срока лета имаго и мелких размеров. Летает высоко в кронах усыхающих елей, в полог леса редко спускается.
18.	Пчела-шерстобит семишпая – <i>Anthidium septemspinosum</i> Lepeletier, 1841	III	–	Малочисленный вид, но угроз численности которому нет.
19.	Пчела-шерстобит длиннорукавая – <i>Anthidium manicatum</i> Linnaeus, 1758	III	–	Малочисленный вид, но угроз численности которому нет.
20.	Шмель спорадичный – <i>Bombus sporadicus</i> Nylander, 1848	II	–	Редкий на юге области вид, на севере области численность стабильна в подходящих местообитаниях.
21.	Орденская лента малая красная –	III	–	Широко распространенный вид со

	<i>Catocala promissa</i> (Denis et Schiffermuller, 1775)			значительным варьированием численности под влиянием естественных факторов.
22.	Фердинандея медная – <i>Ferdinandea cuprea</i> (Scopoli, 1763)	III	–	Малочисленный вид, угрозы численности которому нет.
23.	Цериана конопсовидная – <i>Ceriana conopsoides</i> (Linnaeus, 1758)	III	–	Малочисленный вид, угрозы численности которому нет.
24.	Сфекомия осовидная – <i>Sphecomyia vespiformis</i> (Gorski, 1852)	III	–	Малочисленный вид, редко обнаруживается из-за короткого срока лёта имаго, угрозы численности нет.

А.А.А.

Виды животных, рекомендованные к внесению в Перечень видов животных, занесенных в Красную книгу Кировской области


№	Вид	2025	Обоснование
1.	Крошечная бурозубка – <i>Sorex minutissimus</i> (Zimmermann, 1780)	IV	Находилась в Приложении № 2 к Красной книге Кировской области 2001, 2014. За 100 лет две находки – в 1965 в Омутнинском р-не, в 1991 в Зуевском.
2.	Рыжеватый (Большой) суслик – <i>Spermophilus major</i> (Pallas, 1779)	II	До начала XXI века обитал в самых южных районах. В последние 15 лет нет достоверных сведений о их встречах. Исчезает или исчез в соседних регионах
3.	Большая белая цапля – <i>Casmerodius alba</i> (Linnaeus, 1758)	IV	Появилась в области в 2020-х, в последние годы – ежегодно. В соседних регионах стала гнездиться. Необходима охрана всех мест, где они начнут гнездиться для закрепления вида на территории.
4.	Западный лесной гусеник – <i>Anser fabalis fabalis</i> Latham, 1787	II	Занесён в Красную книгу РФ
5.	Малый лебедь – <i>Cygnus bewickii</i> Yarrell, 1833	III	Занесён в Красную книгу РФ
6.	Орел-карлик – <i>Hieraetus pennatus</i> (J.F. Gmelin, 1788)	IV	На территории области появился в 2019. Единичные встречи в Вятско-Полянском, Малмыжском, Кирово-Чепецком р-нах.
7.	Малый подорлик - <i>Aquila pomarina</i> (C. L. Brem, 1831)	IV	Занесён в Красную книгу РФ
8.	Клуша - <i>Larus fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	II	Занесён в Красную книгу РФ
9.	Клинтух – <i>Columba oenas</i> (Linnaeus, 1758)	II	Появился на территории области в 1970-х, расселился до северных р-нов, в начале 2000-х был ещё обычен в южных р-нах, в последние годы – встречи единичны.
10.	Обыкновенная горлица – <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	II	Занесён в Красную книгу РФ
11.	Большая горлица – <i>Streptopelia orientalis</i> (Latham, 1790)	IV	Появилась в 2021 году, в последующие годы одиночные особи встречены ещё трижды.

12.	Белая сова – <i>Nyctea scandiaca</i> (Linnaeus, 1758)	III	Редкий малочисленный кочующий вид. Страдает от незаконного отстрела.
13.	Сизоворонка - <i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	II	Занесён в Красную книгу РФ
14.	Ястребиная славка – <i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1795)	II	Всегда была немногочисленна. За последние 10 лет встречи стали единичными.
15.	Дубровник - <i>Emberiza aureola</i> (Pallas, 1773)	II	Занесён в Красную книгу РФ
16.	Овсянка-ремез - <i>Emberiza rustica</i> (Pallas, 1776)	V	Занесён в Красную книгу РФ
17.	Завиток узенький – <i>Vertilla angustior</i> (Jeffreys, 1830)	III	Вид включен в список находящихся в состоянии близком к угрожаемому (NT) МСОП, включен Красные книги Ленинградской и Тверской областей. Редкий, малочисленный вид, найден Т.Г Шиховой в Малмыжском, Советском районах. Лимитирующие факторы: изменение мест обитания в результате лесохозяйственной деятельности, рекреация.
18.	Поденковидка карельская – <i>Eurylophella karelica</i> Tiensuu, 1935	II	Реликт последнего ледникового периода. Вторая находка вида в России за последние 100 лет. Отмечена в Нагорском районе (участок «Тулашор» заповедника Нургуш). Лимитирующие факторы: изменение гидрологического режима малых рек при лесохозяйственной деятельности
19.	Плавунец широкий – <i>Dytiscus latissimus</i> Linnaeus, 1758	II	Внесен в Красную книгу РФ. В последние 30 лет вид вымирает по всему европейскому ареалу. По литературным данным и данным экспертов был известен окрестностях г. Кирова, Кирово-Чепецком, Подосиновской и Юрьянском, Малмыжском, Слободском, Котельничском, Советском, Свечинском районах. Современное состояние популяций во многих местообитаний неизвестно. В некоторых местообитаниях повторно вид найти не удалось. Лимитирующие факторы: уменьшение числа пригодных для заселения водоемов и их загрязнение в результате хозяйственной деятельности человека, разрушение береговой зоны
20.	Оленёк обыкновенный – <i>Dorcus parallelipipedus</i> (Linnaeus, 1758)	IV	Редкий малочисленный. Вид включен в Красные книги Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Владимирской и Тамбовской областей. В Кировской области найден в Малмыжском и Вятско-Полянском районах. Лимитирующие факторы: сокращение мест обитания

			(широколиственных лесов) в результате хозяйственной деятельности человека
21.	Рогачик скромный – <i>Ceruchus chrysomelinus</i> (Hochenwarth, 1785)	III	Внесен в Красную книгу РФ. В Кировской области известен из Оричевского, Уржумского, Котельничского, Свечинского районов. Лимитирующие факторы: сокращение старых лесных массивов в результате рубок, вывоз валежной древесины и раскорчевка пней, подрывающие кормовую базу.
22.	Копр лунный – <i>Copris lunaris</i> Linnaeus, 1758)	III	Внесен в Красные книги Нижегородской области и Татарстана. Известна одна многочисленная популяция в Вятскополянском р-не. Лимитирующие факторы: снижение доли пастбищного содержания скота на вольном выпасе животных, смена мест выпаса скота и иное хозяйственное использование лугов. отлов взрослых жуков, привлекающих внимание своей необычной внешностью.
23.	Ручейник бабочковидный – <i>Sembris phalaenoides</i> (Linnaeus, 1758)	III	Редкий малочисленный уязвимый вид. Отмечен в Юрьянском, Нагорском, Нолинском, Советском, Сунском, Свечинском районах и г. Кирове. Лимитирующие факторы: изменение гидрологического режима малых рек при лесохозяйственной деятельности
24.	Перламутровка северная – <i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	III	Редкий болотный вид. Единственная стабильная, но немногочисленная популяция известна в Кирово-Чепецком районе (окр. оз. Орловское). Лимитирующие факторы: очень стенотопный, чрезвычайно локальный и критически малочисленный вид, обитающий, вместе с клюквой болотной, в экстразональных биогеоценозах, являющихся реликтами раннего голоцена. Бабочки совершенно не склонны к разлёту по прилегающим биогеоценозам, характерным для данных районов, поэтому все популяции находятся в длительной полной изоляции. Для них наиболее неблагоприятны нарушения специфической растительности и поверхности сфагновых болот при рубках леса, маневрах техники, добыче торфа, длительных засухах, пожарах, а также загрязнений от свалок мусора.
25.	Пятнашка алькон – <i>Phengaris alcon</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	III	Охраняется в Ленинградской (категория 3), Псковской (2), Вологодской (бионадзор), Тверской (1), Московской (1), Калужской (1), Рязанской (2), Нижегородской (В1) областях, Чувашии (III) и Удмуртии (бионадзор). Гусеницы

			развиваются на горечавках <i>Gentiana pulmonarium</i> и <i>G. cruciata</i>. Облигатный мирмикофил. В Кировской области находится на северной границе ареала. В Кировской области вид известен в Вятскополянском, Малмыжском, Уржумском Кумёнском и Сунском и Нагорском районах. Лимитирующие факторы: очень стенотопный, очень локальный и местами малочисленный вид. Бабочки не склонны к разлёту, но при вспышках численности отдельные особи встречались в 1 – 2 км от ключевых местообитаний. При умеренной фрагментации регионального ареала некоторые соседние популяции оказываются в частичной, а остальные (особенно в лесной зоне) – в повышенной или практической изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны нарушения почвенного покрова, палы, интенсивное сенокошение, вытаптывание травы, выпас скота, приводящие к уничтожению растений горечавок и разрушению муравейников
26.	Пятнашка арион – <i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	III	Включена в список видов, находящихся в состоянии близком к угрожаемому (NT) в списке МСОП. Охраняется в Ленинградской (категория 3), Вологодской (3 (VU)), Псковской (2), Тверской (1), Ярославской (2), Брянской (2), Владимирской (3), Калужской (1), Нижегородской (B1) обл., Удмуртии (3), Чувашии (III), Тюменской (3) обл., включен в список бионадзора в Карелии, Московской обл. В Кировской области на данный момент в бионадзоре. Гусеница питается на тимьяне, душице обыкновенной, черноголовке обыкновенной. Облигатный мирмикофил. Известна из Уржумского (Пилинский лог), Нолинского, Малмыжского и Орловского районов. Лимитирующие факторы: очень стенотопный, чрезвычайно локальный и критически малочисленный вид. Бабочки активно летают, но совершенно не склонны к разлёту из стаций. При высокой фрагментации регионального ареала известные ценопопуляции находятся в полной изоляции. Для них наиболее неблагоприятно уничтожение кормовых растений и муравейников при нарушениях почвенного покрова, палах, интенсивных сенокосах, вытаптывании травы, выпасе скота, а также гибели бабочек до реализации репродуктивного потенциала, т. к. некоторые стации могут

			подвергаться нарушениям в течение всего цикла развития вида.
27.	Чернушка болотная (эмбла) – <i>Erebia embla</i> (Thunberg, 1791)	III	Охраняется в Нижегородской области (А) Известна для Кировской области из трёх локальных фаун (Луза, Киров, Нургуш). Вид с двухгодичной генерация. Дважды зимует гусеница. Местообитания: торфяники, болотистые сосновые редколесья. Лимитирующие факторы: уничтожение и трансформация местообитаний. Нахождение на южной периферии ареала.
28.	Бархатница ютта – <i>Oeneis jutta</i> (Hübner, 1806)	III	Включена в основной список Красных книг Ленинградской (2), Тверской (2), Московской (1), Брянской (1), Нижегородской (В2), Чувашии (I), Башкирии (III), Свердловской (III) обл. Известна для Кировской области из Кирово-Чепецкого, Лузского, Верхнекамского, Котельничского районов. Вид с двухгодичной генерация. Дважды зимует гусеница. Лимитирующие факторы: уничтожение и трансформация местообитаний.
29.	Стволоедка чёрная – <i>Xylophagus ater</i> Meigen, 1804	IV	Является индикатором старовозрастных лесов. Редкий малочисленный. Вид включен в Красную книгу Чувашии. Известен из Котельничского района (заповедник «Нургуш»). Лимитирующие факторы: ограниченность подходящих для вида местообитаний. Вырубка старовозрастных широколиственных лесов, и антропогенное нарушение мест обитания.
30.	Пандивирилия исключительная – <i>Pandivirilia eximia</i> (Meigen, 1820)	III	В Кировской области находится крайнее восточное местонахождение вида. Вид указывался только для Западной Европы. Достоверных находок этого вида в России не было. Занесён в список охраняемых видов в Норвегии. Известен из Котельничского (заповедник «Нургуш»), Нолинского (памятник природы регионального значения «Медведский бор») и Кирово-Чепецкого районов. Лимитирующие факторы: Ограниченность подходящих для вида местообитаний. Вырубка старовозрастных широколиственных лесов, и антропогенное нарушение мест обитания.




**Виды растений и грибов, рекомендованные к сохранению в Перечне
видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской
области, без изменения категории статуса редкости**

№	Вид	Категория
1.	Костенец рута постенная - <i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	I
2.	Гроздовник ланцетовидный - <i>Botrychium lanceolatum</i> (S.G. Gmel.) Angstr.	I
3.	Гроздовник ромашколистный - <i>Botrychium matricariifolium</i> A. Br. ex Koch	I
4.	Живокость клиновидная - <i>Delphinium cuneatum</i> Stev. ex DC.	I
5.	Молочай тонкий - <i>Euphorbia subtilis</i> Prokh.	I
6.	Лапчатка длиннолистная - <i>Potentilla longifolia</i> Willd. ex Schlecht. (<i>Potentilla pennsylvanica</i> L.)	I
7.	Понерорхис клобучковый – <i>Ponerorchis cucullata</i> (L.) X.H.Jin, Schuit. & W.T.Jin (<i>Neottianthe cucullata</i> (L.) Schlechter)	I
8.	Пион уклоняющийся, Марьин корень - <i>Paeonia anomala</i> L.	II
9.	Первоцвет Маттиоли - <i>Primula matthioli</i> (L.) V.A.Richt. (<i>Cortusa matthioli</i> L.)	II
10.	Гаммарбия болотная - <i>Hammarbya paludosa</i> (L.) O. Kuntze	II
11.	Тайник сердцевидный - <i>Neottia cordata</i> (L.) Rich. (<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.)	II
12.	Осока волосовидная - <i>Carex capillaris</i> L.	II
13.	Ковыль перистый - <i>Stipa pennata</i> L.	II
14.	Надбородник безлистный - <i>Epipogium aphyllum</i> Sw.	II
15.	Хвощ камышковый - <i>Equisetum scirpoides</i> Michx.	III
16.	Пузырник горный - <i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv.	III
17.	Пузырник судетский - <i>Cysopteris sudetica</i> A. Br. et Milde (<i>Rhizomatopteris sudetica</i> (A. Br. et Milde) A. Khokhr.)	III
18.	Голокучник Роберта - <i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newm.	III
19.	Сальвиния плавающая - <i>Salvinia natans</i> (L.) All.	III
20.	Кубышка малая - <i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC.	III
21.	Кувшинка четырехгранная - <i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	III
22.	Ветреница лесная - <i>Anemone sylvestris</i> L.	III

23.	Василистник водосборolistный - <i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	III
24.	Прострел раскрытый - <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill. s.l. (incl. <i>Pulsatilla flavescens</i> (Zuccar.) Juz.)	III
25.	Гвоздика Борбаша - <i>Dianthus borbashii</i> Vandas	III
26.	Смолевка днепровская - <i>Silene borysthena</i> (Grun.) Walters	III
27.	Ясколка даурская - <i>Cerastium davuricum</i> Fisch. ex Spreng.	III
28.	Вереск обыкновенный - <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	III
29.	Водяника черная - <i>Empetrum nigrum</i> L. (incl. <i>E. hermaphroditum</i> Hagerup)	III
30.	Первоцвет весенний - <i>Primula veris</i> L. s. l. (incl. <i>Primula macrocalyx</i> Bunge)	III
31.	Молочай Бородина - <i>Euphorbia borodinii</i> Sambuk	III
32.	Камнеломка болотная - <i>Saxifraga hirculus</i> L.	III
33.	Вишня кустарниковая - <i>Cerasus fruticosa</i> Pall.	III
34.	Лапчатка распростертая - <i>Potentilla humifusa</i> Willd. ex Schlecht.	III
35.	Астрагал серповидный - <i>Astragalus falcatus</i> Lam.	III
36.	Клевер люпиновый - <i>Trifolium lupinaster</i> L.	III
37.	Двулепестник парижский - <i>Circaea lutetiana</i> L. (incl. <i>C. quadrisulcata</i> (Maxim.) Franch.)	III
38.	Герань кроваво-красная - <i>Geranium sanguineum</i> L.	III
39.	Лазурник трехлопастный - <i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh.	III
40.	Горечавка легочная - <i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	III
41.	Вероника крапиволистная - <i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	III
42.	Мытник скипетровидный, царский скипетр - <i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	III
43.	Яснотка зеленчуковая - <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. (<i>Galeobdolon luteum</i> Huds.)	III
44.	Колокольчик болонский - <i>Campanula bononiensis</i> L.	III
45.	Псефеллюс сумской - <i>Psephellus sumensis</i> (Kalen.) Greuter (<i>Centaurea sumensis</i> Kalen.)	III
46.	Венерин башмачок настоящий - <i>Cypripedium calceolus</i> L.	III
47.	Гнездовка настоящая - <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	III
48.	Дремлик болотный - <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	III
49.	Кокушник длиннорогий - <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	III

50.	Ситник стигийский - <i>Juncus stygius</i> L.	III
51.	Осока белая - <i>Carex alba</i> Scop.	III
52.	Сиботризетум сибирский – <i>Sibiotrisetum sibiricum</i> (Rupr.) Barberá (<i>Trisetum sibiricum</i> Rupr.)	III
53.	Осока желтая - <i>Carex flava</i> L.	III
54.	Осока средняя - <i>Carex media</i> R. Br.	III
55.	Кладония многоплодная - <i>Cladonia polycarpoides</i> Nyl.	III
56.	Эверния растопыренная - <i>Evernia divaricata</i> (L.) Ach.	III
57.	Уснея бородатая - <i>Usnea barbata</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg.	III
58.	Уснея цветущая - <i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg.	I
59.	Гетеродермия красивая - <i>Heterodermia speciosa</i> (Wulfen in Jacq.) Trevis.	III
60.	Рамалина балтийская - <i>Ramalina baltica</i> Lettau. (<i>Ramalina obtusata</i> (Arnold) Bitter.)	III
61.	Рамалина волосовидная - <i>Ramalina thrausta</i> (Ach.) Nyl.	III
62.	Рамалина элегантная - <i>Ramalina elegans</i> (Bagl. et Carestia) Jatta.	III
63.	Лобария легочная - <i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	II
64.	Нефрома сглаженная - <i>Nephroma laevigatum</i> Ach. = Нефрома красивая – <i>N. bellum</i> (Spreng.) Tuck.	III
65.	Нефрома перевернутая - <i>Nephroma resupinatum</i> (L.) Ach.	III
66.	Саркосома шаровидная - <i>Sarcosoma globosum</i> (Fr.) Caspary.	III
67.	Рядовка-исполин (рядовка огромная) - <i>Tricholoma colossus</i> (Fr.) Quel.	III
68.	Ежевик коралловидный - <i>Hericium coralloides</i> (Scop.: Fr.) Pers.	III
69.	Спарассис курчавый, грибная капуста - <i>Sparassiss crispa</i> (Wulfen) Fr.	III
70.	Полипорус зонтичный, грифола зонтичная - <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.: Fr.) Fr. (<i>Grifola umbellata</i> (Fr.) Pers.)	III
71.	Грифола курчавая - <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray.	III
72.	Трутовик лакированный - <i>Ganoderma lucidum</i> (A.M. Curtis: Fr.) P. Karst.	I
73.	Сетконоска сдвоенная - <i>Phallus duplicatus</i> (Bosc.) Fischer	III
74.	Носток сливовидный - <i>Nostoc pruniforme</i> (Ag.) Elenk.	I
75.	Батрахоспермум четковидный - <i>Batrachospermum moniliforme</i> Roth.	III
76.	Сфероплея кольцевидная - <i>Sphaeroplea annulina</i> (Roth.) Ag.	III



**Виды растений и грибов, рекомендованные к изменению категории
статуса редкости в Перечне видов растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Кировской области**

№	Вид	Категория 2014	Категория 2025	Обоснование
1.	Гроздовник виргинский - <i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	III	II	В связи с антропогенными нарушениями мест произрастания вида идет постепенное сокращение числа местонахождений и численности вида.
2.	Горицвет весенний - <i>Adonis vernalis</i> L.	I	0	На территории Кировской области отмечен однажды в 1929 г. в окрестностях г. Вятские Поляны. Местонахождение вида не подтверждено более 50 лет.
3.	Горицвет апеннинский - <i>Adonis apennina</i> L. (<i>Adonis sibirica</i> Patrin. ex Ledeb.).	III	II	На территории Кировской области отмечен в Афанасьевском и Верхнекамском районах, где в связи с активным использованием населением, как декоративного и лекарственного растения, вид сокращает численность, которая была и ранее низкой.
4.	Крупка подольская – <i>Draba podolica</i> (Besser) Rupr. (<i>Schivereckia podolica</i> (Bess.) Andrz. ex DC.)	II	I	На территории Кировской области отмечен лишь в 2-х местонахождениях в Советском районе с сокращающей численностью в результате активной рекреационной деятельности и в связи с изменением видового состава сообществ за счет пополнения рудеральными видами.
5.	Подлесник Жиральда - <i>Sanicula giraldii</i> H. Wolff	III	II	Данный вид имеет на территории области 2 местонахождения, изменение мест обитания вида приводит к сокращению его численности.

6.	Наголоватка васильковая - <i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Reichenb.	III	II	Вид встречается в 2-х местонахождениях, в ООПТ «Медведский бор» произошло резкое снижение численности и вид находится под угрозой исчезновения.
7.	Цмин песчаный - <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	I	0	Впервые указан в работе Александрова (1961) более никем не указывался в течение более 50 лет.
8.	Пупочник ползучий - <i>Memoremea scorpioides</i> (Haenke) A.Otero, Jim.Mejías, Valcárcel & P.Vargas (<i>Omphalodes scorpioides</i> (Haenke) Schrank)	III	II	На территории Кировской области отмечен в Малмыжском и Уржумском районах. Однолетнее травянистое растение подверженное колебаниям численности, в одном из местообитаний не отмечалось повторно.
9.	Наперстянка крупноцветковая - <i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	III	II	На территории Кировской области отмечено единственное местонахождение в Вятскополянском районе, любой негативный фактор (вырубка леса, сбор на букеты и лекарство) может привести к полному исчезновению вида.
10.	Ятрышник шлемоносный - <i>Orchis militaris</i> L.	II	I	Вид достоверно известен из одного местонахождения. Малочисленность ценопопуляции и нарушение местообитаний в результате интенсивной рекреации приводит к изменению численности. Красная книга РФ (2024).
11.	Липарис Лезеля - <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	III	I	Небольшое количество особей выявлено в одном местонахождении на границе с УР, изменение гидрологического уровня на болоте приведет к полной его утрате. Красная книга РФ (2024).
12.	Калипсо луковичная - <i>Calypso bulbosa</i> (L.) Oakes	III	II	Вид встречается в местах с хорошо выраженным моховым

				покровом в лесах, в результате вырубок леса и изменением структуры сообществ исчезает, тенденции сокращения вида связана и с климатическими изменениями. Красная книга РФ (2024).
13.	Ладьян трехнадрезный - <i>Corallorhiza trifida</i> Chatel.	III	II	Вид произрастает в старовозрастных лесах. Сокращение численности связано с уменьшением площади местообитаний в результате вырубки лесов
14.	Пальчатокоренник Траунштейнера - <i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut.) Soo' s. l.	III	II	Достаточно редкий вид встречается в местах с хорошо выраженным покровом из сфагновых мхов на болотах, в результате вырубок леса, изменением структуры болотных сообществ исчезает, тенденции сокращения вида связана и с климатическими изменениями. Красная книга РФ (2024).
15.	Пальчатокоренник зелёный – <i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase (<i>Coeloglossum viride</i> (L.) C. Hartm.)	III	II	На территории Кировской области отмечен ранее в Афанасьевском, Лузском и Омутнинском районах. В последние годы произрастание выявлено только в одном районе.
16.	Пыльцеголовник красный - <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	III	II	Вид встречается в лесах с малонарушенной лесной подстилкой, в результате вырубок леса и изменением структуры сообществ исчезает. Красная книга РФ (2024).
17.	Венерин башмачок пятнистый - <i>Cypripedium guttatum</i> Sw.	III	II	Данный вид на территории области произрастает на болотах и в результате изменение мест обитания вида постепенно сокращается в численности.
18.	Осока головчатая - <i>Carex capitata</i> L.	III	II	На территории Кировской области отмечен лишь в одном местонахождении в

				Слободском районе однажды.
19.	Осока богемская - <i>Carex bohémica</i> Schreb.	II	III	Редкий вид, численность которого сильно колеблется по годам в зависимости от благоприятных для вида условий для произрастания.
20.	Пухонос дернистый – <i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm. (<i>Baeothryon caespitosum</i> (L.) A. Dietr.)	III	II	На территории Кировской области отмечен в 2 местонахождениях. В местах находок площадь ценопопуляций незначительна.
21.	Гвоздика песчаная - <i>Dianthus arenarius</i> L.	II	III	Светолюбивое растение, не требовательное к плодородию почвы. В области произрастает в остепненных сосновых лесах и на антропогенно нарушенных участках на песчаной почве. Популяции стабильны и снижение численности не выявлено.
22.	Гвоздика китайская - <i>Dianthus chinensis</i> L. (<i>Dianthus fischeri</i> Spreng., <i>D. versicolor</i> Fisch. ex Link)	IV	III	Относится к редким видам, в области произрастающим на высоких лугах поймы р. Вятки и имеет стабильные популяции, т.е. статус вида вполне определенный.
23.	Болотоцветник щитковый - <i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmel.) O. Kuntze	III	IV	На территории Кировской области отмечен в Лузском районе однажды и в настоящее время сохранность популяции вида не выявлена.
24.	Толстянка водная – <i>Crassula aquatica</i> (L.) Schönland (<i>Tillaea aquatica</i> L.)	III	IV	На территории Кировской области отмечен в Верхнекамском районе в г. Кирсе однажды и в настоящее время сохранность популяции вида не выявлена. Красная книга РФ (2024).
25.	Дербенник волжский – <i>Lythrum volgensae</i> D.A. Webb (<i>Peplis alternifolia</i> Bieb.)	III	IV	Ранее было известно единственное местонахождение вида на площади 8 м² и численность до 100 экз., в настоящее время сохранность популяции вида не выявлена.
26.	Полевица Корчагина - <i>Agrostis</i>	III	IV	На территории Кировской

	<i>korczaginii</i> Senjan.-Korcz.			области отмечен в черте г. Кирова и его произрастание в области мало изучено.
27.	Тимьян блошиный - <i>Thymus pulegioides</i> L. (<i>Thymus ovatus</i> Mill.)	IV	III	Вид имеет стабильные популяции в местах произрастания.
28.	Пухонос альпийский – <i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers. (<i>Baeothryon alpinum</i> (L.) Egor.)	IV	III	Вид имеет стабильные популяции в местах произрастания.
29.	Лилия кудреватая, саранка - <i>Lilium martagon</i> L. (incl. <i>Lilium pilosiusculum</i> (Freyn) Misch.)	II	III	Редкий вид, имеет стабильные популяции в местах произрастания.
30.	Сплахнум бутылковидный - <i>Splachnum ampullaceum</i> Hedw.	III	IV	Отсутствуют данные о распространении и состоянии вида на территории Кировской области на протяжении последних 20 лет
31.	Цинклидиум стигийский - <i>Cinclidium stygium</i> Sw.	III	IV	Отсутствуют данные о распространении и состоянии вида на территории Кировской области на протяжении последних 20 лет
32.	Меезия длинноножковая - <i>Meesia longiseta</i> Hedw.	III	IV	Отсутствуют данные о распространении и состоянии вида на территории Кировской области на протяжении последних 20 лет
33.	Туидиум нежный - <i>Thuidium delicatulum</i> (Hedw.) B. S. G.	III	IV	Отсутствуют данные о распространении и состоянии вида на территории Кировской области на протяжении последних 20 лет
34.	Дрепаноклад тонкожилковый - <i>Drepanocladus sordidus</i> (Müll.Hal.) Hedenäs (<i>Drepanocladus tenuinervis</i> T. Kop.)	III	IV	Отсутствуют данные о распространении и состоянии вида на территории Кировской области на протяжении последних 20 лет
35.	Нефромопсис Лаурера – <i>Nephromopsis laureri</i> (Kremp.) Kurok. (<i>Tuckneraria laureri</i> (Kremp.) Randlane & Thell)	III	II	Вид, сокращающий численность. Встречается в старовозрастных лесах. Чувствителен к нарушению естественных местообитаний

А.С.Самойлов

**Виды растений и грибов, рекомендованные к исключению из Перечня
видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской
области**

№	Вид	Категория 2014	Категория 2025	Обоснование
1.	Коротконожка лесная - <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	III	-	Обычный лесной злак в южной половине области, слабо выявлено его распространение.
2.	Схизахна мозолистая – <i>Schizachne purpurascens</i> subsp. <i>callosa</i> (Turcz. ex Griseb.) T.Koyama et Kawano (<i>Schizachne callosa</i> (Turcz. ex Griseb.) Ohwi)	III	-	В области произрастает в хвойно- широколиственных и широколиственных травяных лесах на склонах в южной половине, тенденции к изменению численности не имеется.
3.	Тонконог сизый, келерия сизая - <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC. s. l.	III	-	Лесостепной вид, нередко встречающийся в сосновых лесах южной части области, тенденций к сокращению численности нет.
4.	Качим метельчатый - <i>Gypsophila paniculata</i> L.	III	-	Антропотолерантный вид. Тяготеет к нарушенным экотопам
5.	Таволга обыкновенная - <i>Filipendula vulgaris</i> Moench	IV	-	В южной части области обычный вид характерный для дубрав, пойменных лугов и лесных опушек. Тенденций к сокращению численности не наблюдается и не необходимости в первоочередной охране.
6.	Синеголовник плоский - <i>Eryngium planum</i> L.	III	-	В южной части области вид характерен для дубрав, пойменных лугов. Тенденций к сокращению численности не наблюдается и не необходимости в первоочередной охране. Популяции вида стабильны и имеют тенденцию к расширению ареала, в том числе и по антропогенным местообитаниям.
7.	Котовник голый – <i>Nepeta nuda</i> L. (<i>Nepeta pannonica</i> L.)	III	-	В южной части области обычный вид характерный для лугов и лесных опушек. Тенденций к сокращению численности не

				наблюдается и не необходимости в первоочередной охране.
8.	Тимьян панонский - <i>Thymus pannonicus</i> All. (<i>Thymus marschallianus</i> Willd.)	IV	-	На территории Кировской области отмечен в Кирово-Чепецком районе, как заносный вид встречается на железнодорожных насыпях в других районах. Данный лесостепной вид имеет значительно удаленные границы ареала, вероятнее всего на сухой склон попал с железной дороги и не имеет природных популяций в области.
9.	Пижма щитковая – <i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip. (<i>Pyrethrum corymbosum</i> (L.) Scop.)	III	-	В южной части области обычный вид характерный для широколиственных лесов и лесных опушек. Тенденций к сокращению численности не наблюдается и не необходимости в первоочередной охране.
10.	Посконник коноплевый - <i>Eupatorium cannabinum</i> L.	III	-	В южной части области вид характерен для низинных болот и берегов ручьев. В местах находок чаще всего обилён, имеет тенденцию к расширению ареала.
11.	Серпуха венценосная - <i>Serratula coronata</i> L.	III	-	В южной части области обычный вид характерный для дубрав, пойменных лугов и лесных опушек. Тенденций к сокращению численности не наблюдается и не необходимости в первоочередной охране.
12.	Пальчатокоренник (пальцекорник) майский - <i>Dactylorhiza majalis</i> (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerhayes (<i>Dactylorhiza baltica</i> (Klinge) Orlova	III	-	Вид исключен из Красной книги РФ (2024) из-за неясного таксономического статуса и в связи с более широким ареалом, чем указывалось ранее, в области также представлен не редко. Объединен с пальчатокоренником майским в единый таксон.
13.	Пальчатокоренник (пальцекорник) майский - <i>Dactylorhiza majalis</i> (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerhayes.	III	-	Вид исключен из Красной книги РФ (2024) из-за неясного таксономического статуса и в связи с более широким ареалом, чем указывалось ранее, в области также представлен не редко.

14.	Пальчатокоренник кровавый – <i>Dactylorhiza cruenta</i> (O.F. Muel.) Soo' (<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó)	III	-	Один из обычных видов пальчатокоренников в области, растет на болотах и пойменных лугах
15.	Пальчатокоренник (пальцекорник) пятнистый - <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soo'	III	-	В связи с изменениями таксономии вид перестал существовать как отдельная единица
16.	Атрихум желтоножковый - <i>Atrichum flavisetum</i> Mitt.	III	-	Имеются данные о достаточно широком распространении вида на территории области и приуроченности его к нарушенным (в т.ч. и антропогенно нарушенным) местообитаниям. Численность вида стабильна, угроз для его существования нет.
17.	Атрихум тоненький - <i>Atrichum tenellum</i> (Rohl.) B. S. G.	III	-	Имеются данные о распространении вида на территории области по преимущественно безлесным нарушенным (в т.ч. и антропогенно нарушенным) территориям, в связи с чем территориальная охрана данного вида представляется весьма проблематичной. Численность вида стабильна, угроз для его существования нет.
18.	Буксбаумия безлистная - <i>Buxbaumia aphylla</i> Hedw.	III	-	Имеются данные о достаточно широком распространении вида на территории области и приуроченности его к нарушенным (в т.ч. и антропогенно нарушенным) местообитаниям. В целом антропогенные нарушения (противопожарная опашка лесов) способствуют поддержанию и повышению численности вида. Численность вида стабильна, угроз для его существования нет.

19.	Фиссиденс моховидный - <i>Fissidens bryoides</i> Hedw.	III	-	Имеются данные о достаточно широком распространении вида на территории. Численность вида стабильна, угроз для его существования нет.
20.	Неккера перистая - <i>Neckera pennata</i> Hedw.	III	-	Имеются данные о достаточно широком распространении вида на территории. Вид – эпифит, поселяющийся на осинах. Наибольшей численности достигает в производных осинниках, сформировавшихся на местах вырубок коренных лесов. Численность вида стабильна, угроз для его существования нет.
21.	Рамалина притупленная - <i>Ramalina obtusata</i> (Arnold) Bitter.	III	-	В результате изменения систематики вид объединен с Рамалиной балтийской <i>Ramalina baltica</i> Lettau. в единый таксон
22.	Решетник азиатский - <i>Boletinus asiaticus</i> Sing.	III	-	Вид с узкой трофической специализацией, образует микоризу с лиственницей. Численность в последние годы восстановилась
23.	Гиропорус синеющий, синяк - <i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.: Fr.) Quel.	III	-	Исключён из КК России. Образует микоризу с берёзой. Численность в последние годы восстановилась
24.	Гимнопус скученный - <i>Gymnoporus acervatus</i> (Fr.) Murrill.	III	-	Вид с широкой трофической специализацией. Ксилотроф. Численность в последние годы увеличилась, угроз для его существования нет.
25.	Омфалиастер звездчатоспоровый - <i>Omphaliaster asterosporus</i> (J.E. Lange) Lamoure.	IV	-	Вид с широкой трофической специализацией. Подстилочный сапротроф зеленомошных лесов. Численность в последние годы увеличилась, угроз для его существования нет.
26.	Ежевик гребенчатый - <i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.	III	-	Южный вид, произрастает в лиственных лесах. Внесен во второе издание Красной книги Кировской области со сведениями о находках в двух локациях. С момента обнаружения не получено данных,

				подтверждающих произрастание вида на территории Кировской области, в том числе в местах раннего обнаружения
27.	Лиственничная губка - <i>Fomitopsis officinalis</i> (Vill.: Fr.) Bondartsev et. Singer.	III	-	Среда обитания – старые лиственничные леса, которых в Кировской области сохранилось крайне мало. Внесен в первое издание Красной книги Кировской области со сведениями о находке в одной локации. С момента обнаружения не получено данных, подтверждающих произрастание вида на территории Кировской области, в том числе в месте раннего обнаружения
28.	Дождевик (головач) гигантский - <i>Langermannia gigantea</i> (Pers.) Rostk.	IV	-	Гумусовый сапрофит, заносный вид. Обитает на пастбищах и в поймах рек.
29.	Мутинус равенеля - <i>Mutinus ravenelii</i> (Berk. & M.A. Curtis) E. Fisch.	IV	-	Гумусовый сапрофит, заносный вид. Обладает широкой экологической приспособляемостью. Встречается в городской среде.
30.	Мутинус собачий – <i>Mutinus caninus</i> (Huds.: Pers) Fr.	IV	-	Гумусовый сапрофит, заносный вид. Обладает широкой экологической приспособляемостью. Встречается в городской среде.

А.С. Самойлов

**Виды растений и грибов, рекомендованные к внесению в Перечень
видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской
области**

№	Вид	Категория 2025	Обоснование
1.	Подорожник наибольший – <i>Plantago maxima</i> Juss. Ex Jacq.	IV	Редкий, повсеместно сокращающийся в численности вид. Произрастает в поймах рек Камы и Вятки. В связи с отсутствием данных о состоянии популяции и распространении на территории Кировской области необходимо включение в Красную книгу Кировской области с IV категорией, поиск популяций и обеспечение охраны вида.
2.	Гапнокладиум мелколистный – <i>Haplocladium microphyllum</i> (Hedw.) Broth.	II	Уязвимый вид с сокращающейся численностью; преимущественно американско-азиатский вид с немногочисленными находками в Европе; приурочен к старовозрастным широколиственным и южнотаежным лесам. В ряде регионов Европейской части России вероятно исчез: в Московской области известен только по сборам XIX и начала XX века. Внесен Красную Книгу Республика Марий Эл (2013). Отмечен в кластере «Нургуш» заповедника «Нургуш».
3.	Дисцелиум голый - <i>Discelium nudum</i> (Dicks.)	III	Вид с дизъюнктивным голарктическим распространением, но везде крайне редок; находится на южной границе ареала; требователен к эдафическим условиям, обитает на сырой глинистой почве, занесен в Красные книги Республики Коми (2019) и Карелии (2020). Отмечен в кластере «Тулашор» заповедника «Нургуш».
4.	Фонтиналис гипновидный - <i>Fontinalis hypnoides</i> Hartm.	III	Редкий вид, индикатор чистых водоемов, внесен в Красные книги Нижегородской области, Удмуртской республики
5.	Дихелима серповидная - <i>Dichelima falcatum</i> (Hedw.) Myrin	II	Преимущественно горный голарктический вид, встречающийся местами на равнине на севере

			бореальной и юге арктической зон, требовательный к чистоте воды, в соседних регионах известен по единичным находкам, занесен в Красные книги Республики Коми, Марий Эл (2013), Костромской (2019) и Нижегородской областей (2017). Отмечен в обоих кластерах заповедника «Нургуш».
6.	Дикранум зелёный – <i>Dicranum viride</i> (Sull. et Lesq.) Lindb.	II	Уязвимый вид, численность которого сокращается, внесен в Приложение I Бернской Конвенции, как нуждающийся в охране на территории Европы. Вид с голарктическим распространением с большими дизъюнкциями в континентальных районах, приурочен к старовозрастным широколиственным лесам. Внесен Красные Книги РФ (2024), Нижегородской (2017), Московской (2019) областей, Республики Коми (2019). Отмечен в кластере «Нургуш» заповедника «Нургуш».
7.	Фрулляция дубовая – <i>Frullania oakesiana</i> Austin	II	Неморальный вид с узкой экологической амплитудой, в Европе связан с влажными широколиственными и хвойно-широколиственными лесами и осинниками; внесен в IUCN Red List, как вид, находящийся в состоянии близком к угрожаемому (NT), в Красные Книги Нижегородской (2017), Ленинградской (2017), Тверской (2024) областей. Отмечен в обоих кластерах заповедника «Нургуш».
8.	Рамалина Реслера – <i>Ramalina roesleri</i> (Hochst. ex Schaer.) Hue	III	Редкий, стенотропный вид, приурочен к старовозрастным лесам с влажным микроклиматом. Встречаются единичные экземпляры. Занесен в Красные книги Республики Коми, Татарстан, Марий Эл, Архангельской области
9.	Лептогиум приручейный – <i>Leptogium rivulare</i> (Ach.) Mont.	I	Внесен в Красную книгу РФ, Республики Коми, Марий Эл. Один из редчайших лишайников в мире, приурочен к пойменным лесам.
10.	Гипогимния Биттера – <i>Hypogymnia bitteri</i> (Lynge) Ahti	IV	Вид приурочен к старовозрастным лесам. Отмечен на территории государственного природного заказника регионального значения «Былина»

11.	Дендрискостикта холодная – <i>Dendriscosticta gelida</i> Ant. Simon, Goward et T. Sprib.	IV	Внесен в Красную книгу РФ, Пермского края, Республики Коми. Вид приурочен к старовозрастным лесам, индикатору ненарушенных фитоценозов. Отмечен в Кайгородском национальном парке на границе с участком «Тулашор» заповедника «Нургуш».
12.	Пельтигера холмовая – <i>Peltigera collina</i> (Ach.) Schrad.	IV	Вид приурочен к старовозрастным влажным и пойменным лесам, где заселяет замшелые основания стволов деревьев. Отмечен на территории государственного природного заказника регионального значения «Былина». Занесен в Красную книгу Республики Коми
13.	Нефрома одинаковая – <i>Nephroma parile</i> (Ach.) Ach.	III	Вид приурочен к малонарушенным лиственным и смешанным лесам. Отмечен на территории государственного природного заказника регионального значения «Былина». Занесен в Красные книги Нижегородской области, Удмуртской республики
14.	Микростома вытянутая – <i>Microstoma protractum</i> (Schaeff.) Singer.	III	Уязвимый вид с сокращающейся численностью; повсеместно редкий вид с немногочисленными находками в Европе; космополит; в России распространен преимущественно в южных районах, повсюду редок; внесен в Красные книги Республики Марий Эл, Татарстан. Приурочен к южнотаежным, хвойным и смешанным лесам с наличием хвойного опада и погребенной древесины. Отмечен в кластере «Нургуш» заповедника «Нургуш».
15.	Сморчковая шапочка коническая – <i>Morchella conica</i> (O.F.Mull.) Sw.	III	Уязвимый вид с сокращающейся численностью; повсеместно редкий вид с немногочисленными находками в Европе; приурочен к смешанным лесам. Сапротроф. Внесен в Красные книги Республик Марий Эл (2020), Татарстан. Отмечен в кластере «Нургуш» заповедника «Нургуш».
16.	Холвея слизистая – <i>Holwaya mucida</i> (Shulzer) Korf et Abawi	III	Уязвимый вид с сокращающейся численностью; повсеместно редкий вид с немногочисленными находками в Европе; приурочен к смешанным лесам.

			Ксилотроф. Отмечен в кластере «Нургуш» заповедника «Нургуш».
17.	Вешенка дубовая - <i>Pleurotus dryinus</i> (Pers.) P. Kumm.	III	Уязвимый вид с сокращающейся численностью. Голарктический вид, реликт неморальной микофлоры. В России обнаружен преимущественно в южных и центральных районах европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (внесен в Красную книгу Амурской области; GBIF). Повсеместно редок. Ксилотроф. Встречается преимущественно в старовозрастных смешанных и широколиственных лесах. Отмечен в кластере «Нургуш» заповедника «Нургуш».
18.	Дубовик оливково-бурый – <i>Boletus luridus</i> Schaeff.	III	Уязвимый вид с сокращающейся численностью; повсеместно редкий вид с немногочисленными находками в Европе; приурочен к смешанным лесам. Сапротроф. Отмечен в кластере «Нургуш» заповедника «Нургуш».
19.	Руброболет Дюпена - <i>Rubroboletus dupainii</i> (Boud.) Kuan Zhao et Zhu L. Yang	III	Уязвимый вид с сокращающейся численностью; повсеместно редкий вид с немногочисленными находками в Европе; приурочен к смешанным и широколиственным лесам. Сапротроф. Отмечен в кластере «Нургуш» заповедника «Нургуш».
20.	Лисичка серая – <i>Cantharellus cinereus</i> Pers.	III	Уязвимый вид с сокращающейся численностью; повсеместно редкий вид с немногочисленными находками в Европе; приурочен к смешанным лесам. Сапротроф. Отмечен в кластере «Нургуш» заповедника «Нургуш».
21.	Звездовик гребенчатый – <i>Geastrum pectinatum</i> Pers.	III	Уязвимый вид с сокращающейся численностью; повсеместно редкий вид с немногочисленными находками в таежных регионах России. Приурочен к смешанным лесам преимущественно на известковой почве. Сапротроф. Включен в Красную книгу Республики Карелия. Отмечен в кластере «Нургуш» заповедника «Нургуш».
22.	Рамария красивая - <i>Ramaria formosa</i> (Pers.) Quél.	III	Уязвимый космополитный вид с сокращающейся численностью; повсеместно редкий вид с

			немногочисленными находками в Европе; приурочен к смешанным лесам. Сапротроф, ксилотроф. Отмечен в кластере «Нургуш» заповедника «Нургуш».
23.	Рамария финская - <i>Ramaria fennica</i> (P.Rarst.) Ricken	III	Уязвимый голарктический вид с сокращающейся численностью; повсеместно редкий вид с немногочисленными находками в Европе; приурочен к смешанным лесам. Сапротроф, ксилотроф. Отмечен в кластере «Нургуш» заповедника «Нургуш».
24.	Сыроежка зеленоватая - <i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr.	III	Уязвимый вид с сокращающейся численностью; повсеместно редкий вид с немногочисленными находками в Европе; приурочен к смешанным лесам. Сапротроф. Отмечен в кластере «Нургуш» заповедника «Нургуш».
25.	Амилоцистис лапландский - <i>Amylocystis lapponica</i> (Romell) Bondartsev & Singer	III	Уязвимый вид с сокращающейся численностью; повсеместно редкий вид с немногочисленными находками в Европе. Голарктический бореальный вид. приурочен к старовозрастным хвойным лесам. Ксилотроф. Отмечен в кластере «Нургуш» заповедника «Нургуш», государственном природном заказнике регионального значения «Былина»
26.	Резинопория толстая - <i>Resinoporia crassa</i> (P. Karst.) Audet -	III	Уязвимый циркумбореальный вид с сокращающейся численностью; повсеместно редкий вид коренных малонарушенных лесов с немногочисленными находками в ряде регионов европейской части России, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Ксилотроф. Отмечен в кластере «Нургуш» заповедника «Нургуш», государственном природном заказнике регионального значения «Пижемский»
27.	Печеночница обыкновенная - <i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. –	IV	Уязвимый неморальный космополитный вид с сокращающейся численностью; повсеместно редкий вид с немногочисленными находками в европейской части России, на Урале; приурочен к старым широколиственным лесам. Ксилотроф. Отмечен в государственном природном заказнике регионального значения «Пижемский»

28.	Ишнодерма смолистая - <i>Ischnoderma resinosum</i> (Schrad.) P. Karst.	III	Уязвимый циркумбореальный вид с сокращающейся численностью; повсеместно редкий вид; встречается преимущественно в южных регионах, приурочен к широколиственным лесам. Ксилотроф. Отмечен в государственном природном заказнике регионального значения «Пижемский»
29.	Саркодонция пенообразная - <i>Sarcodontia spumea</i> (Sowerby) Spirin	III	Уязвимый голарктический неморальный вид с сокращающейся численностью; повсеместно редкий вид с немногочисленными находками в центральных и южных регионах европейской части, на Урале, Сибири, дальнем Востоке; приурочен к смешанным и широколиственным лесам. Ксилотроф. Отмечен в кластере «Нургуш» заповедника «Нургуш».
30.	Паппия расщепляющаяся - <i>Pappia fissilis</i> (Berk. & M.A. Curtis) Zmitr.	III	Уязвимый голарктический неморальный вид с сокращающейся численностью; повсеместно редкий вид с немногочисленными находками в центральных и южных регионах европейской части, на Урале, Сибири, дальнем Востоке; приурочен к смешанным и широколиственным лесам. Ксилотроф. Отмечен в кластере «Нургуш» заповедника «Нургуш».
31.	Болетопсис серый - <i>Boletopsis grisea</i> (Peck) Bondartsev & Singer	III	Уязвимый голарктический вид с сокращающейся численностью; повсеместно редкий вид с немногочисленными находками в Ленинградской, Мурманской, Свердловской и Тульской областях, Республиках Коми, Карелия, Крым; приурочен преимущественно к сосновым лесам. Сапротроф. Отмечен в государственном природном заказнике регионального значения «Былина».



**Виды растений, вероятно исчезнувшие из дикой природы на территории
Кировской области**

№	Вид	Статус, категория 2014	Обоснование
1.	Горицвет весенний - <i>Adonis vernalis</i> L.	I	На территории Кировской области отмечен однажды в 1929 г. в окрестностях г. Вятские Поляны. Местонахождение вида не подтверждено более 50 лет.
2.	Цмин песчаный - <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	I	Впервые указан в работе Александрова (1961) более никем не указывался в течение более 50 лет.
3.	Ива сетчатая – <i>Salix reticulata</i> L.		Редкий вид на южной границе распространения, который был выявлен более 50-ти лет назад и более на территории области не находился.
4.	Сосна сибирская, кедр сибирский – <i>Pinus sibirica</i> Du Tour.	Приложение №2	Вид был выявлен более 50-ти лет назад в Афанасьевском р-не на восточной границе распространения. К настоящему моменту популяция утрачена, иные популяции в естественной среде обитания не выявлены. Экземпляры кедр, произрастающие на территории области, интродуцированы и не подлежат охране в рамках Красной книги Кировской области.

